



# F1 ہائبرڈ بہترین بیج بہترین پیداوار

**syngenta®**

سنجینٹا کے تمام پروڈکٹس **نیاسویرا**  
اور منتخب ڈیلر کے پاس دستیاب ہیں



زرعی زہر سے متاثر ہونے کی  
صورت میں سنجینٹا سے مشاورت کیلئے  
فون نمبر 0800-23567  
پر رابطہ قائم کریں۔



## سنجینٹا پاکستان لمیٹڈ

حیدرآباد

پلاٹ نمبر اے۔ 66 / اے، سائٹ، حیدرآباد۔

فون: (022) 3885045/3885046/3885047

فیکس: (022) 3885044

ملتان

موضع کوئٹہ ابوالفتح، نزد انڈسٹریل اسٹیٹ آف بانی پاس روڈ، ملتان۔

فون: (061) 6539658 - 9 / 6537073 / 6539638

فیکس: (061) 6539660

ساہیوال

8 کے ایم ملتان روڈ، ساہیوال

فون: (040) 5002726 / 5002727 / 5002736

فیکس: (040) 4225362

کراچی

15th فلور، التجارہ سینٹر، 1-32 اے، بلاک 6،

پی ای سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 75400

فون: (021) 38677200

فیکس: (021) 38677220

رحیم یار خان

وحی شاہ محمد پیل گری کنال،

شہباز پور روڈ، رحیم یار خان۔

فون: 0316-6888284 - 6888285

لاہور

پلاٹ نمبر 13 سُدر انڈسٹریل اسٹیٹ

سُدر رائیونڈ روڈ، لاہور

فون: (042) 35297706/35297707

35297708/35297709

یہ کتابچہ مواد پہلے سے موجود تمام پروڈکٹ بروشرز/الٹرنیٹ کی جگہ لے گا۔

## بونى F-1



### بونى F-1 كى خصوصيات

- پھول گو بھی كے پھول كارنگ سفيد
- پھول گو بھی كے پھول ٹھوس گندھے ہوئے ايک جيسے خوبصورت ہوتے ہيں جسكى وجہ سے ريٹ زيادہ ملتا ہے
- پھول گو بھی كے ٹھوس پھول سے زيادہ پيداوار
- منتقلی كے بعد 85-80 دن ميں تيار
- مختلف موسمی حالات كے خلاف بہترين قوت مدافعت
- پھول گو بھی كا پودا مضبوط اور پتے سيدھے
- پھل كا اوسط وزن 1.5 سے 2 كلوگرام


### سفارشات برائے استعمال

وقت منتقلی	وقت کاشت		شرح بیج
زسرى بجائی كے 35-30 دن بعد	اکتوبر تا جنوری	صوبہ پنجاب	2-3 پيکٹ فی ايکڑ بيک سايز 10 KS (10,000 سيڈ فی پيکٹ)
	ستمبر تا 15 جنوری	صوبہ خيبر پختونخواں	
	ستمبر تا 15 جنوری	صوبہ سندھ	
	ستمبر تا 15 جنوری	صوبہ بلوچستان	

## سملہ F-1

زيادہ پيداوارى  
صلاحيت

### سملہ F-1 كى خصوصيات



- پھول گو بھی كے پھول كارنگ سفيد
- پھول گو بھی كے پھول ٹھوس گندھے ہوئے ايک جيسے خوبصورت ہوتے ہيں جسكى وجہ سے ريٹ زيادہ ملتا ہے
- منتقلی كے 80-90 دن ميں تيار
- پودے كا قدر لمبا اور پتوں كا پھول كو ڈھانپ كے رکھنا
- سردی كے خلاف قوت مدافعت ركھتی ہے
- پھول گو بھی كے پتے سيدھے ہونے كى وجہ سے في ايکڑ زيادہ پودے
- پھل كا اوسط وزن 1.5 كلوگرام

### سفارشات برائے استعمال

وقت منتقلی	وقت کاشت		شرح بیج
زسرى بجائی كے 35-30 دن بعد	15 ستمبر تا دسمبر	صوبہ پنجاب	8-10 پيکٹ فی ايکڑ بيک سايز 2.5 KS (2500 سيڈ فی پيکٹ)
	ستمبر تا دسمبر	صوبہ خيبر پختونخواں	
	ستمبر تا دسمبر	صوبہ سندھ	
	ستمبر تا دسمبر	صوبہ بلوچستان	

# پنیری کی کاشت اور منتقلی

پنیری کی کاشت کا طریقہ



زرخیز میرا زمین کا انتخاب کریں

زمین کی تیاری کے بعد 6 انچ اونچا 4 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا بیڈ تیار کریں

11 ایکڑ کے لیے 6-8 بیڈ کی ضرورت ہوگی

پنیری کی کاشت کیلئے لائن سے لائن کا فاصلہ 3 انچ جب کہ بیج سے بیج کا فاصلہ ایک سے ڈیڑھ انچ رکھیں

اگاؤ تک صبح شام فوارے سے پانی لگائیں

بیج لگانے کے بعد پرالی سے ڈھانپ دیں اور جب اگاؤ مکمل ہو جائیں تو پرالی ہٹالیں

پنیری کو کھاد کا چھوٹے دینے سے گریز کریں

## طریقہ کاشت

پودے سے پودے کا فاصلہ 1-1½ فٹ

لائن سے لائن کا فاصلہ 2-2½ فٹ

## زمین کی تیاری

پنیری کی منتقلی

پنیری کو منتقلی کے دوران مندرجہ اور سائے میں رکھیں

پودے کو زمین میں لگانے کیلئے کاٹی لٹرن کے نشان تک کا حصہ مٹی میں دبا دیں

پودوں کی منتقلی کے فوراً بعد پانی لگا دیں تاکہ جڑیں زمین میں مضبوطی سے اپنی جگہ بنالیں

منتقلی کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ زمین میں پودے کی جڑیں سیدھی ہوں

زرخیز میرا زمین کا انتخاب کریں جس میں پانی کا نکاس اچھا ہو

ایک سوراخ میں ایک پودا لگائیں

زمین کو ہل چلا کر پھر اکر لیں

زمین کی تیاری کے بعد پڑیاں بنا لیں

## کھادوں کا استعمال

وقت استعمال	فاسفورس کھاد	پوٹاش کھاد	نائیٹروجن کھاد
زمین کی تیاری کے وقت	1-1.5 بیگ فی ایکڑ (DAP)	ایک بیگ فی ایکڑ (SOP)	½ بیگ یوریا فی ایکڑ
پنیری کی منتقلی کے 20-25 دن بعد	—	ایک بیگ فی ایکڑ (SOP)	ایک بیگ یوریا فی ایکڑ
پنیری کی منتقلی کے 40-45 دن بعد	—	—	ایک بیگ یوریا فی ایکڑ

## پھول گوبھی کے مسائل اور ان کا حل

مرحلہ	بھائی	پنیری کی منتقلی	پھل پانے کا مرحلہ
مسئلہ	بیج کا انتخاب	زمین میں نامیاتی مادے کی کمی زنگ کی کمی، جڑی بوٹیاں	ڈائمنڈ بیک موٹھ فوری خوراک، بورون کی کمی
حل	پھول گوبھی	نیارک	سولیبور
	سلسلہ F-1	نیارک	سولیبور
وقت کاشت اور وقت استعمال	اکتوبر تا جنوری	زرخیز میرا زمین کی تیاری کے وقت کھادیں مار کر بھریں ڈیو آؤ گولڈ منتقلی کے فوراً بعد نیارک منتقلی کے 20-25 دن بعد	ڈائمنڈ بیک موٹھ فوری خوراک، بورون کی کمی ایز ایلان
شرح مقدار	8-10 پکٹ فی ایکڑ	4 پکٹ فی ایکڑ	80 پکٹ فی ایکڑ