

ایکسپورٹیبیل  
رائس پروگرام  
syngenta®

دھان کی ابتدائی دیکھ بھال  
بنے کاشتکار خوشحال

syngenta®



Toll Free: **080023567**

[Syngenta.Pakistan](https://www.facebook.com/Syngenta.Pakistan) [SyngentaPakistan](https://www.youtube.com/SyngentaPakistan)  
pk.info@syngenta.com

سنجینٹا کی تمام زرعی ادویات  
نیاسوییرا پر دستیاب ہیں



زرعی زہر سے متاثر ہونے کی  
صورت میں سنجینٹا سے مشاورت کیلئے  
فون نمبر **0800-23567**  
پر رابطہ قائم کریں۔



سنجینٹا پاکستان لمیٹڈ

کراچی

15th فلور، اتھارہ سینٹر، 32-1 اے، بلاک 6،  
پی ای سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 75400  
فون: (021) 38677200  
فیکس: (021) 38677220

حیدرآباد

پلاٹ نمبر اے-24-اے-1، سائٹ ایریا، حیدرآباد۔  
فون: 022-3885046

رحیم یار خان و نیر ہاؤس

گری کنال، وحی شاہ محمد  
نزد پرائمری سڈیز، رحیم یار خان  
فون: 0316-6888284 / 0316-6888285  
0316-6888286

ملتان

مونیج کوئلہ ابوالفتح بزدانہ سٹریٹ اسٹیٹ آف بانی پاس روڈ، ملتان۔  
فون: (061) 6539658 - 9 / 6537073 / 6539638  
فیکس: (061) 6539660













لاہور

پلاٹ نمبر 13 سندر انڈسٹریل اسٹیٹ  
سندر راجیونڈ روڈ، لاہور  
فون: (042) 35297706 / 35297707  
35297708 / 35297709

ساہیوال

اے ایم ملتان روڈ، ساہیوال  
فون: (040) 5002726 / 5002727 / 5002736  
فیکس: (040) 4225362

# دھان کی مرحلہ وار دیکھ بھال

									
80-90*	65-70	40-45	20	10	02-10	-	-10	-	فصل کی عمر
مکمل گوبھ کی حالت (5 فیصد سٹہ)	گوبھ کا ابتدائی مرحلہ	سٹہ بننے کے عمل کا آغاز	مکمل جھاڑ	ابتدائی جھاڑ	لاب کی منتقلی	زمین کی تیاری	پنیری	زمین کی تیاری	فصل کی حالت
 امیستار ڈپ  پولینم  کراٹے ضرورت کے مطابق	 امیستار ڈپ اور  اسٹور اور  ایزابیک	 ورٹا ٹو 0.6 جی آف تنے کی سٹری کے لیے اور  ورٹا ٹو 40 ڈی بی جی تنے کی سٹری اور پتہ لپیٹ کے خاتمے کے لیے	 ورٹا ٹو 0.6 جی آف  نیا نیک پلس	 لیفٹ 50-0 جی بی لاب منتقلی کے بعد 2 دن کے اندر  اپائیر و فورٹ 50-0 جی بی لاب منتقلی کے بعد 7-10 دن کے اندر	 اترچ ضرورت کے مطابق	 اپرون میکس اور رائیسیر 16-0 جی بی	 اترچ ضرورت کے مطابق	 سنجینٹا کی سفارشات	
پلاسٹ اور لیف اسپاٹ سے بچاؤ بھورے تیلے سے بچاؤ کے لیے	پلاسٹ اور لیف اسپاٹ سے بچاؤ سٹہ بننے کے عمل میں کارآمد	تنے کی سٹری اور پتہ لپیٹ سٹری کے خاتمے کے لیے	تنے کی سٹری کے خاتمے کے لئے	پودوں کو زنگ کی فراہمی	ابتدائی مراحل میں جڑی بوٹیوں کے روک تھام کے لئے	پودوں کی بہترین نشوونما کے لئے	پودوں کی بہترین نشوونما کے لئے	استعمال کی وجوہات	

\*نوٹ: تمام ذریعہ ادویات کا استعمال فصل کی  
کنائی سے 55 دن پہلے روک دیا جائے۔

سنجینٹا کا یہ کراپ پروگرام دھان کی عمدہ کوالٹی، زیادہ پیداوار اور برآمدات  
کو بڑھانے کے لئے مربوط کیا گیا ہے۔

نوٹ: تمام زرعی ادویات کو لیبل کے مطابق استعمال کریں۔



## سنجینٹا پروگرام برائے ایکسپورٹ کوالٹی چاول

پاکستان چاول کی برآمدات میں دنیا کا تیسرا اہم ملک ہے۔ ہر زرعی اجناس کی برآمدگی کیلئے ایم آر ایل انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی جارہی ہے اسکا لیول زیادہ ہونے کے نتیجے میں برآمدات کو مسترد کیا جاسکتا ہے جو کہ ملک اور ایکسپورٹرز دونوں کیلئے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس کی وجہ سے پاکستانی چاول کی ایکسپورٹ پر بھی مکمل پابندی لگ سکتی ہے۔

سنجینٹا نے چاول کی فصل میں ایم آر ایل کے خطرے کو کم کرنے کیلئے پروڈکٹ ۶ سیلیکیشن کا ایک پروڈکول بنایا جسکا پچھلے سال کئی فارم پر عملی مظاہرہ کیا اور ایم آر ایل لیول کی تصدیق کیلئے جرمنی کے eurofins لیب میں نمونے بھیجے۔ چاول کے تمام نمونوں کے ایم آر ایل، ای یو (European Union) کے قائم کردہ اسٹینڈرڈ سے کم نکلے، جو کہ آئندہ کے لیے خوش آئین بات ہے۔



## دھان کی فصل کی جان



**غذائی ضروریات کے مسائل:** دھان کی فصل میں جھاڑ کے عمل سے ہی فصل کو مختلف غذائی اجزاء کی ضروریات ہوتی ہے جس کا سلسلہ دانوں کی بھرائی تک جاری رہتا ہے، اگر غذائی ضروریات پوری نہ ہوں تو فصل کی نشوونما نہیں ہو پاتی اور دانوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔

**تعارف:** دھان کی فصل کی بڑھوتری کے لیے غذائی اجزاء نہایت اہم ہے، ایذا بیان پودے کو فوری توانائی اور غذائیت فراہم کرتا ہے جس سے خصوصی طور پر پیداوار کے اہم مرحلوں میں خوراک بننے میں مدد ملتی ہے اس میں موجود ضروری لمبائیوں اور پروٹین کی بدولت پودے کو بڑھتے میں اور سٹے بننے میں مدد ملتی ہے۔



پودے کی مناسب نشوونما

دانوں کی بھرپور بھرائی میں مددگار

فصل کو فوری غذا کی فراہمی

ماحولیاتی/موسمیاتی دباؤ سے بچاؤ

### سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ	وقت استعمال
400 ملی لیٹر فی ایکڑ	پہلا سہرے مکمل جھاڑ بننے پر دوسرا سہرے گوبھ کی حالت پر

**تعارف:** جھلساؤ دھان کی فصل کا سب سے زیادہ نقصان کرنے والی بیماری ہے۔ دھان کا بھبکا اور بھورے دھبے کی وجہ سے سٹہ دانوں سے خالی رہ جاتا ہے اور دانوں پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں اور شدید حملے کی صورت میں پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اسکوور سنخینڈا کا برسوں سے آزمودہ زہر ہے جو دہری سرائیٹ پذیری کی بنا پر پیلاہیوں پر مؤثر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

**تعارف:** پتہ لپیٹ سنڈی کا حملہ گرم موسم میں تیزی سے ہوتا ہے۔ پتہ لپیٹ سنڈی لڈوں سے نکتے ہی پتے کے کنارے کو لپیٹ کر سرنگ بنتی ہے اور پتوں کا سبز مادہ تیزی سے کھاتی ہے جس سے پودے میں خوراک بنانے کا عمل رک جاتا ہے۔ پتہ لپیٹ سنڈی کے مسئلہ سنخینڈا کے پاس ایک وسیع اثر کراٹے موجود ہے جو پتہ لپیٹ سنڈی پر مؤثر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔



• ٹوٹے سے محفوظ چمکدار چاول

• جھلساؤ کو بڑھنے سے روکتا ہے


• وسیع دائرہ عمل

• منفرد طریقہ اثر

• ہر موسم میں کارگر

### سفارشات برائے استعمال

مستلہ	وقت استعمال	مقدار فی ایکڑ	وقفہ قبل از استعمال
بلا سٹ	پہلا سپرے مکمل چھاڑ بننے پر دوسرا سپرے گوبھ کی حالت پر	125 ملی لیٹر فی ایکڑ	14 دن



• پتہ لپیٹ پر مؤثر کنٹرول

• منفرد طریقہ اثر (Repellent Action)  
• کے ذریعے سنڈیوں کو ختم کر دیتا ہے


• بارش میں بھی اس کا اثر زائل نہیں ہوتا

### سفارشات برائے استعمال

مستلہ	مقدار	وقفہ قبل از استعمال
پتہ لپیٹ سنڈی	200 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی	14 دن

ایسیسٹارٹاپ® | ایک منفرد امیستار ٹیکنالوجی کے ساتھ

**تعارف:** ایسیسٹارٹاپ سنجینٹا کی ایسیسٹار ٹیکنالوجی پر مشتمل ایک انقلابی پھپھوندی کش زہر ہے جو اپنے وسیع دائرہ اثر کی بدولت دھان کی اہم بیماریوں پر کنٹرول دیتا ہے۔



- بارش کے بعد اثر زائل ہونے سے محفوظ
- فصل کی بہترین کارکردگی
- زیادہ پیداوار
- مدافعتی بیماریوں پر موثر
- ہری بھری، صحت مند فصل
- پیداوار میں یقینی اضافہ

**منفرد طریقہ اثر**  
ایسیسٹارٹاپ اپنے تین طرح کے ایکشن کی وجہ سے انتہائی موثر اور دیر پا اثر دیتا ہے۔

- سراہت پذیری
- پتے کے آرپد ہونا
- زہر کی زد میں آنا



سفارشات برائے استعمال

مسئلہ	وقت استعمال	مقدار فی ایکڑ	وقفہ قبل از استعمال
براؤن لیف اسپوٹس	گوبھ کی حالت میں	300 ملی لیٹر فی ایکڑ / 200 ملی لیٹر فی ایکڑ	28 دن

ٹوٹے سے محفوظ چمکدار چاول | پلیسٹیم®

**تعارف:** دھان کی فصل پر پلانٹ ہاپر یعنی سفید اور بھوری پشت والے تیلے کا حملہ پچھلے چند سالوں سے شدید ہوتا جا رہا ہے۔ پلانٹ ہاپر کا زیادہ تر حملہ پیداواری مرحلہ پر ہوتا ہے۔ دھان کو اس مرحلے پر اگر بھوری یا سفید پشت والے تیلے کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پیداوار میں 100\* فیصد تک نقصان ہو سکتا ہے۔

**نقصانات:** سفید اور بھوری پشت والے تیلے کی بالغ اور بچے دونوں پودوں سے رس چوستے ہیں۔ پتے ابتدائی حملہ کے دوران پہلے ہو جاتے ہیں اور بعد میں بھورے رنگ کے نظر آتے ہیں۔ شدید حملہ کی صورت میں کھیت ٹکڑوں کی صورت میں جلے ہوئے نظر آتے ہیں جسے باہر برن کہا جاتا ہے۔



- بھوری پشت والا تیلے کا فصل سے رس چوسنا بند
- فصل ہاپر برن سے محفوظ
- تیلے کی افزائش نسل بند

سفارشات برائے استعمال

مسئلہ	وقت استعمال	مقدار فی ایکڑ	وقفہ قبل از استعمال
پلانٹ ہاپر	بھوری پشت والے تیلے کا حملہ ظاہر ہوتے ہی اسپرے کریں	120 گرام فی ایکڑ	20 دن