


کوانٹس™

آغاز سے اختتام تک محفوظ فصل جاندار چھلی



syngenta®

پیداواری صلاحیت کے لیے مکئی پر سنجھنٹا کپ پروگرام



Toll Free: 080023567

[Syngenta.Pakistan](#) [SyngentaPakistan](#) [pk.info@syngenta.com](#)

® Syngenta Participations AG Basel, Switzerland
© 2022 Syngenta



بماری و بسانٹ ورز کرنے کے لیے
اوپر دیکھ کر کوڈ کو سکن کریں
[www.syngenta.com.pk](#)

ایک تو سارے اور زیر نہیں پر مشتمل
پائی جاسو لیٹھت ہے۔

مکئی کوموسیماتی دباؤ سے بچانے
ہر اسپرے میں کوانٹس ملانا ہے

استعمال کے لیے سفارشات

منڈل	موسیماں دباؤ
مقدر	800 لیٹر فی ایکڑ
وقت استعمال	ایک اسپرے پاؤ دے کے 5 پتوں کے مرطل پر کریں۔



نیا پوتاش
نیا پوتاش
نیا پوتاش

جاندار فصل، شاندار پہل

استعمال کے لیے سفارشات

منڈل	پوتاش کی کی
مقدر	3 لیٹر فی ایکڑ
وقت استعمال	بجلی فریگیشن 6 سے 8 پتوں پر دوسرا فریگیشن شے بننے کے آغاز پر



لرورز® اپنی فصل کو دین بہترین آغاز



استعمال کے لیے سفارشات

مسئلہ	شوت قائمی
مقدار	10 ملی لیٹر زہر فی کلو گرام نیچے
وقت استعمال	10 ملی لیٹر زہر 15-10 ملی لیٹر پانی میں فی کلو گرام کمیں۔

پریسیکسٹر اگولٹ®

ابتدائی مرحلے پر جڑی بوٹیوں کا خاتمه

استعمال کے لیے سفارشات

مسئلہ	چورٹے چوپ ولی جڑی بوٹیاں، گھاس نماور ڈیلا
مقدار	800 ملی لیٹر فی کیلو
وقت استعمال	جڑی بوٹیاں اگنے سے پہلے تروتھات میں



نیازنٹ پلس

فصل کی بہترین نشوونما

پارہوز اسکن (Auxin). بننے میں انہیں کروڑا کرتا ہے۔

استعمال کے لیے سفارشات

مسئلہ	زکن کی کمی
مقدار	7.5 کلو گرام فی کیلو
وقت استعمال	پہلی کھلاکے ساتھ چھوڑ کریں۔



نہایت اجراء کی ترسیل

نہایت ایسٹ کا عمل ہے

زکن کی دعییٰ ہے

پرٹاکو® 0.6 جی آئر

تنے کی سندی کا مؤثر اور مکمل حل

دو جدید اور منفرد زہروں (TMX+CTPR) پر مشتمل کیمیسری۔

استعمال کے لیے سفارشات

مسئلہ	تنے کی سندی
مقدار	4 کلو گرام فی کیلو
وقت استعمال	پہلی زہر ہاشی: بھجنی کے بعد 3 سے 4 پتوں کی حالت پر۔ دوسرا زہر ہاشی: بھجنی کے بعد مکنی کے 6 پتوں کی حالت پر۔



ماخوذ دوست، کسان دوست اور افضل دوست

3 سے 25 فٹ تک کھروں

زیادہ پیداوار

ڈوال اگولٹ® 1960 ایسی

مکنی میں جڑی بوٹیوں کا نقصان سے پہلے خاتمه

استعمال کے لیے سفارشات

مسئلہ	جڑی بوٹیاں
مقدار	800 ملی لیٹر فی کیلو
وقت استعمال	بھجنی کے فرائد 24 گھنٹوں کے اندر تروتھات میں جڑی بوٹیوں کے اگنے سے پہلے اپرے کریں۔



کم خرچ پیداوار زیادہ

جڑی بوٹیاں پر 45 دن سے زیادہ کھروں

پو دے تندست و توہنا



نیازنک دیگر کھاد (امالے) فائلنگ (کے ساتھ) کا استعمال کیا جاتا ہے۔

گھاس نماور چورٹے پتے
والي جڑی بوٹیاں اور زہر کا
انگے سے پہلے خاتمہ۔

پریسیکسٹر اگولٹ®

ابتدائی مرحلے پر جڑی بوٹیوں کا خاتمه

استعمال کے لیے سفارشات

مسئلہ	چورٹے چوپ ولی جڑی بوٹیاں، گھاس نماور ڈیلا
مقدار	800 ملی لیٹر فی کیلو
وقت استعمال	جڑی بوٹیاں اگنے سے پہلے تروتھات میں



ٹائپر خود مات

رس پیٹے والے کیمیں کا استعمال

اضر

دے زمین کو نئی زندگی

استعمال کے لیے سفارشات

مسئلہ	نامیلے کے کمی
مقدار	8 کلو گرام کھلاکے ساتھ چھوڑ کریں۔
وقت استعمال	زمین کی تیاری کے وقت (سفافور سی پیٹاں اور ولی کھاد کے ساتھ ملا کر)
وقت استعمال	زمین کی تیاری کے وقت (سفافور سی پیٹاں اور ولی کھاد کے ساتھ ملا کر)



استعمال کے لیے سفارشات

مسئلہ	شوت قائمی
مقدار	10 ملی لیٹر زہر فی کلو گرام نیچے
وقت استعمال	10 ملی لیٹر زہر 15-10 ملی لیٹر پانی میں فی کلو گرام کوچک کمیں۔