

جب کیپاس ہو جاندار تو ملے منافع شاندار



Toll Free:
080023567

f Syngenta.Pakistan

▶ SyngentaPakistan

✉ pk.info@syngenta.com

بجائی سے پہلے کا مرحلہ



انرج™
ہیٹل انڈیا ڈیولپمنٹ

مقدار فی ایکڑ 8 کلوگرام
وقت استعمال زمین کی تیاری کے وقت کوئی بھی کھاد کے ساتھ ملا کر ڈالیں

بجائی کا مرحلہ



ٹروزر™
۳۵۰ ایس ایس

دوائی کی مقدار 1 کلوگرام بیج کے لیے 6 لیٹر زیر
طریقہ استعمال 6 لیٹر زیر 14-19 لیٹر پانی
اس حلال کو بذریعہ سپر ٹریٹمنٹ مشین یا پلاسٹک شیٹ سے کیپاس کے برائے ہونے چاہئے لگائیں۔
کر دزر کو بچھڑا لگانے کے بعد سائے دار جگہ پر خشک کریں اور پھر کاشت کریں۔

پھول گڈی آنے سے پہلے کا مرحلہ



امیسٹارٹاپ™



کوانٹس™



ایلیسٹل نیو™
۵۰۰ ڈی ڈی



نیازنٹک پلس™



سولیوبور™
۲۰ MULE TEAM BORAX



سولیوپو™
۱۱۰۸ ایس ایس

پھول گڈی کا مرحلہ



اصیستار 20

مستلہ
محلہ ۱۰
وقت استعمال
گوہجی کی حالت میں
پہلا اسپرے بجائی کے 60 دن کے بعد
دوسرا اسپرے 10 دن کے وقفے سے کریں۔
مقدار فی ایکڑ
200 لیٹر فی ایکڑ



ایصپلی 150 زیڈ سی

نقصان دہ کیڑا
گلابی سڈی (لاروا اور بانج)
مقدار فی ایکڑ
160 لیٹر
پانی کی مقدار
125 - 150 لیٹر
وقت استعمال
حملہ نظر آتے ہی



ایزابیان

مقدار فی ایکڑ
400 لیٹر
پہلا اسپرے: بجائی کے 45-50 دن بعد
دوسرا اسپرے: پہلے اسپرے کے 15 دن بعد
تیسرا اسپرے: دوسرے اسپرے کے 15 دن بعد
وقت استعمال
حملہ نظر آتے ہی



سولیوبور

مقدار فی ایکڑ
500 گرام
پہلا اسپرے بجائی کے 40 دن کے بعد
دوسرا اسپرے: پہلے اسپرے کے 15 دن بعد
وقت استعمال



سلیج ۰.۵ ای سی

مقدار فی ایکڑ
100 لیٹر
نقصان دہ کیڑا
لنگری سڈی کے آئندے یا حملہ نظر آتے ہی۔
وقت استعمال



پولیٹرین سی

نقصان دہ کیڑا
گلابی سڈی، برس چوسنے والے کیڑے
مقدار فی ایکڑ
500 سے 600 لیٹر
پہلا اسپرے بجائی کے 35 دن کے بعد۔
دوسرا اسپرے 15 دن کے وقفے سے کریں۔
وقت استعمال



پولیو

نقصان دہ کیڑے
اسپرے کا وقت
معاشرتی حد
سفید مکھی، بڑبڑا اور جوں کی معاشرتی نقصان کی حد پر
پہلا اسپرے: 200 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سفید مکھی،
سینچے، بڑبڑا اور جوں کا حملہ ظاہر ہونے پر کریں دوسرا
اسپرے: 200 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے 7 دن کے
وقفے سے اسپرے کریں
سفید مکھی (5 بانج یا سینچے یا دونوں ملا کر پیٹ)
بڑبڑا (1 بانج یا سینچے یا دونوں ملا کر پیٹ)
جوں (حملہ نظر آتے ہی)

پھل پھول / ٹینڈے بننے کا مرحلہ



سلیج ۰.۵ ای سی

مقدار فی ایکڑ
100 لیٹر
نقصان دہ کیڑا
لنگری سڈی کے آئندے یا حملہ نظر آتے ہی۔
وقت استعمال



پولیٹرین سی

نقصان دہ کیڑا
گلابی سڈی، برس چوسنے والے کیڑے
مقدار فی ایکڑ
500 سے 600 لیٹر
پہلا اسپرے بجائی کے 35 دن کے بعد۔
دوسرا اسپرے 15 دن کے وقفے سے کریں۔
وقت استعمال



پولیو

نقصان دہ کیڑے
اسپرے کا وقت
معاشرتی حد
سفید مکھی، بڑبڑا اور جوں کی معاشرتی نقصان کی حد پر
پہلا اسپرے: 200 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سفید مکھی،
سینچے، بڑبڑا اور جوں کا حملہ ظاہر ہونے پر کریں دوسرا
اسپرے: 200 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے 7 دن کے
وقفے سے اسپرے کریں
سفید مکھی (5 بانج یا سینچے یا دونوں ملا کر پیٹ)
بڑبڑا (1 بانج یا سینچے یا دونوں ملا کر پیٹ)
جوں (حملہ نظر آتے ہی)



ایصپلی 150 زیڈ سی

نقصان دہ کیڑا
گلابی سڈی (لاروا اور بانج)
مقدار فی ایکڑ
160 لیٹر
پانی کی مقدار
125 - 150 لیٹر
وقت استعمال
حملہ نظر آتے ہی

ساہیوال

8 کا کیمٹان روڈ، ساہیوال
فون: 5002726 / 5002727 / 5002736
فیکس: 4225362 (040)

لاہور

پلاٹ نمبر 13 سائڈ لائن سٹریٹ
سائڈ لائن سٹریٹ، لاہور
فون: 35297706 / 35297707
فیکس: 35297708 / 35297709 (042)

ملتان

موشیح کوٹلا ایچ ٹی سٹریٹ سائڈ لائن سٹریٹ آف بانی پاس روڈ ملتان۔
فون: 6539658-9 / 6537073 / 6539638 (061)
فیکس: 6539660 (061)

رحیم یار خان و ٹیرہاؤس

گری کنال، موشیح شاہجہ
نزدیک ٹی ایم سڈیز، رحیم یار خان
فون: 0316-6888284-0316-6888285
فیکس: 0316-6888286

حیدرآباد

پلاٹ نمبر 24-2-1-1، سائڈ لائن سٹریٹ، حیدرآباد۔
فون: 022-3885046

کراچی

15th فور، اتھارہ سٹریٹ، 32-1، بلاک 6،
پانی کی سائڈ لائن، سائڈ لائن سٹریٹ، کراچی۔ 75400
فون: 38677200 (021) / 38677220 (021)

سینجینٹا پاکستان لمیٹڈ