

# کیاس کا آغاز

پھل گڈی کی حفاظت، صحتمند ٹینڈوں کی ضمانت

دوسرا مرحلہ

syngenta®

TM

# ایلیسٹل نیو®


۵۴ ڈی لیٹروں

## اب ڈر بھاگے گا!

سفید مکھی کے بچوں اور بالغ سے بچاؤ کے لئے۔



سفید مکھی



نئی ویون ٹیکنالوجی زراعتیلم اور فلوئیم  
کے ذریعے پودے میں سرایت  
پراپر ہوتی ہیں



اسپرسے کے ایک گھنٹے بعد  
بارش سے زہر کا اثر زائل  
نہیں ہوتا



سفید مکھی  
سے تحفظ

### سفارشات برائے استعمال

وقت استعمال	مقدار	پروڈکٹس
سفید مکھی کی مچائی نقصان کی حد (5 بالغ یا بچے پودوں ہمارکری پتا)	100 گرام فی ایکڑ 200 ملی لیٹر فی ایکڑ	ایلیسٹل نیو بیسٹن



گانٹوں کا کم فاصلہ

# کوانٹس™


کپاس کو موسمی دباؤ سے بچانا ہے  
براسپرے میں کوانٹس ملانا ہے...



فصل کو ضروری غذا  
کی دستیابی



فرٹیلائٹی اور ریپر ڈو گیشن  
میں اضافہ



موسمیاتی دباؤ سے  
فصل کا تحفظ

مستلہ | پانی کی کمی اور موسمیاتی دباؤ

مقدار | 400 ملی لیٹر

استعمال | کاشت کے 35 دن بعد یا کسی بھی پہلے اسپرے کے بعد

دوسرا اسپرے 15 دن کے وقفے کے بعد

امیسٹارٹاپ®


امیسٹارٹاپ ایک منفرد  
امیسٹارٹیکنالوجی کے ساتھ



ہری پھری، صحت  
مند فصل۔



بارش کے بعد اثر زائل  
ہونے سے محفوظ،



ماحول اور دوست کیڑوں  
کے لیے محفوظ


مستلہ | جھلساؤ  
مقدار | 200 ملی لیٹر فی ایکڑ  
استعمال | پہلا اسپرے بجائی کے 60 دن کے بعد  
دوسرا اسپرے 10 دن کے وقفے سے کریں۔



تھریس

سولویگو™  
108 ایس سی

سولویگو کا وار نہ جائے خالی  
تھریس کا خاتمہ فصل میں لائے ہریالی...



فصل زیادہ سرسبز و  
شاداب



2 گھنٹے بعد بارش سے اثر  
ضائع نہیں ہوتا



تھریس کا  
بہترین کنٹرول

مستلہ | تھریس  
مقدار | 500 ملی لیٹر  
استعمال | فصل کے ابتدائی مرحلے میں حملہ شروع ہوتے ہی  
10 تا 8 باغ یا پچھٹی پتہ۔

سولیوبور® 20 MULE TEAM BORAX

پھل پھول برقرار، بہتر پیداوار



پودے کے تمام حصوں تک  
خوراک کی موثر ترسیل



پھل پھول کی شکل برقرار،  
میزے بھی شاندار



پھل پھول جھڑنا بند  
(کیرے سے تحفظ)

مستلہ | بوران کی کمی  
مقدار | 500 گرام فی ایکڑ  
استعمال | پہلا اسپرے: بجائی کے 40 دن کے بعد  
دوسرا اسپرے: پہلا اسپرے کے 15 دن بعد

نیازنک پلس


کیاس کی بہتر نشوونما



زنک کی کمی



نشوونما میں باقاعدگی



ہارمون آکسن بنانے  
میں اہم کردار



ضیائی تالیف کا  
بہتر استعمال

مستلہ | زنک کی کمی  
مقدار | 7.5 کلو گرام فی ایکڑ  
استعمال | پہلی کھاد (یوریا) ڈالنے وقت اسے استعمال کریں۔

