

کیاس کا آغاز

کیڑوں سے فصل محفوظ، صحتیہ اور توانا

تیسرا مرحلہ

syngenta®

TM

ایزابیات

برٹینڈا کھلے پھٹی



بھری پوپیا اور
حاصل ہوتی ہے



ٹینڈے وزن دار،
صحت مند ہوتے ہیں



زیادہ ٹینڈے جیتے ہیں

مسئلہ | غذائی اجزاء کی فوری دستیابی
مقدار | 400 ملی لیٹر فی ایکڑ
استعمال | پہلا اسپرے: بجائی کے 45-50 دن بعد
دوسرا اسپرے: پہلے اسپرے کے 15 دن بعد
تیسرا اسپرے: دوسرے اسپرے کے 15 دن بعد



کلابی سنڈی

ایسپیلی گو 150 زیڈ سی

بڑھائے کپاس کی شان
جو بکنے میں ہو آسان



کیڑوں میں زہر کے خلاف
قوت مدافعت بیجمنٹ (آئی آر
ایم) کے لیے بہترین پارٹنر



ڈبل ایکشن ہونے کی وجہ سے
طے دیر پا دور موثر کنٹرول




بارش کے بعد بھی زہر کا اثر
زائل نہیں ہوتا

مسئلہ | گلابی سنڈی (لاروا اور بالغ)
مقدار | 160 ملی لیٹر فی ایکڑ
پانی کی مقدار | 150-125 ملی لیٹر فی ایکڑ
استعمال | حملہ نظر آتے ہی

امیستارٹاپ®


امیستارٹاپ ایک منفرد
امیستارٹیکنالوجی کے ساتھ



ہری بھری، صحت
مند فصل۔



بارش کے بعد اثر زراعت
ہونے سے محفوظ،



ماحول اور دوست کیڑوں
کے لیے محفوظ

مستلہ | جھلساؤ
مقدار | 200 ملی لیٹر فی ایکڑ
استعمال | پہلا اسپرے بجائی کے 60 دن کے بعد
دوسرا اسپرے 10 دن کے وقفے سے کریں۔



وزن دار ٹینڈے



پولو®
50 ایس سی

وزنی ٹینڈے اور
مکمل بھرائی



ٹیڈوں کی مکمل بھرائی اور
آخری پھل بھی محفوظ



کیڑے کے سانس لینے کے عمل
میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور 3 دن
میں ہلاک کرتا ہے



سفید مکھی اور بچے کے علاوہ
سبز تیل اور جوں پر کنزول

مستلہ | سفید مکھی، سبز تیل اور جوں کی معاشی نقصان کی حد پر
اسپرے کا وقت | پہلا اسپرے: 200 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سفید مکھی، بچے، سبز تیل اور جوں کا حملہ ظاہر ہونے
پر کریں دوسرا اسپرے: 200 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے 7 دن کے وقفے سے اسپرے کریں
معاشی حد | سفید مکھی: 5 بانغ یا سچے یادوں ملا کر فی پتہ | سبز تیل: 1 بانغ یا سچے یادوں ملا کر فی پتہ | جوں: حملہ نظر آتا ہی

پولیٹرین سی ۳۳ ای سی



کپاس کی چاندی کو سونا بنائے



گلابی سڈی

پیداوار کا 40 سے 50 فیصد پیداواری مرحلے میں بننے والی پھول گندی پر منحصر ہے۔



پولیٹرین سی کے استعمال پر پھول پھول گندی اور فصل سخت مند



رس چوسنے والے کیڑے اور پھول گندی کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کا موثر کنٹرول



مسئلہ | گلابی سڈی، رس چوسنے والے کیڑے
مقدار | 500-600 ملی لیٹر فی ایکڑ
استعمال | پہلا اسپرے: بجائی کے 35 دن کے بعد دوسرا اسپرے 15 دن کے وقفے سے کریں۔

میچ ۰.۵ ای سی

میچ کا کوئی میچ نہیں



لٹکری سڈی

عام زہروں کے مقابلے میں 2-3 ہفتوں تک کنٹرول



ساتھ ملائے جانے والے زہر کی کارکردگی اور دائرہ اثر بڑھا دیتا ہے



ہر قسم کے زہر کے ساتھ ٹینک مکس کی سہولت



مسئلہ | لٹکری سڈی
مقدار | 100 ملی لیٹر فی ایکڑ
استعمال | لٹکری سڈی کے آڈے پاملہ نظر آتے ہی۔

سولیوبور 20 MULE TEAM BORAX

پھل پھول برقرار، بہتر پیداوار



پودے کے تمام حصوں تک خوراک کی موثر ترسیل



پھل پھول کی شکل برقرار بنانے کی شندار



پھل پھول جھڑنا بند (کیڑے سے تحفظ)



مسئلہ | بوران کی کمی
مقدار | 500 گرام فی ایکڑ
استعمال | پہلا اسپرے: بجائی کے 40 دن کے بعد دوسرا اسپرے: پہلے اسپرے کے 15 دن بعد۔

© Syngenta Participations, AG Basel, Switzerland
© 2023 Syngenta

یہ کنایہ لٹریچر پختے تمام پروڈکٹ کنایہ لٹریچر کا متبادل ہے۔

سینجینٹا پاکستان لمیٹڈ

15 طر، اسلام آباد، سٹرک 32-1 سے، بلاک 6، پلاٹ 4، گھاس، میں صدر محل، کراچی 75400-
فون: (021)38677200، فیکس: (021)38677200

